Información generada para: AVUI
BARCELONA

19/05/08

Prensa: Diaria
Tirada: 42.771 Ejemplares
Difusión: 29.047 Ejemplares

Página: 23

Sección: SOCIEDAD Valor: 1.990,23 Área (cm2): 725,9 Ocupación: 83,1 % Documento: 1/1 Cód: 20117612

Culs fets a mida

Creix la demanda d'operacions d'augment de glutis, tant en dones com en homes ▪ Elles es fixen en l'actriu Jennifer Lopez i ells en Antonio Banderas ▪ Les pròtesis impedeixen muntar a cavall o anar amb bici

Marta Ciércoles
BARCELONA

La demanda d'operacions d'augment de glutis és una de les que més creix en l'àmbit de la cirurgia estètica. A la Clínica Planas, per exemple, aquest any n'han fet gairebé 50, cinc cops més que fa tan sols un parell d'anys, segons explica el doctor Jorge Planas, director mèdic del centre. Encara hi ha més dones que demanen aquesta intervenció, però més d'un 30% de les peticions ja provenen d'homes. La gran majoria tenen entre 25 i 50 anys. Elles volen aconseguir unes natges del tipus brasiler. Un model concret a imitar és el de l'actriu Jennifer Lopez. Quant als models masculins, un dels culs que té més èxit és el d'Antonio Banderas.

El doctor José Abel de la Peña Salcedo, director de l'Instituto de Cirugía Plástica Ciudad de México, va ser el pioner en aquest tipus d'intervencions, ara fa vint anys. Recentment ha visitat Barcelona per participar en el XVI Curs Internacional de Cirurgia Plàstica i Estètica de la Clínica Planas, on va mostrar els darrers avenços en aquestes operacions, que assegura que cada cop generen més interès a causa de "l'impacte del món llatinoamericà".

Qüestió de genètica

El Brasil, Mèxic i Colòmbia són els països on més es practica i més es demana la cirurgia de glutis. "Genèticament, les races llatinoamericanes tenim menys projecció de glutis", argumenta el doctor De la Peña. Amb tot, al Brasil, on hi ha una forta barreja amb la població vinguda de l'Àfrica, els glutis "amb projecció" són força habituals. El problema és que, precisament per això, "les persones que no els tenen, els volen tenir", diu el doctor.

Per donar volum als glutis es poden fer servir dos procediments: l'implant de greix del mateix pacient procedent d'altres parts del cos o bé l'ús de pròtesis de silicona. La primera opció només és possible, segons explica el doctor Jorge Planas, si el pacient té prou greix en altres parts del cos que, a més, vol eliminar.

L'ús de pròtesis de silicona és el procediment més utilitzat. Un cop fet l'estudi antropomètric, l'equip mèdic decideix quina és la mida ideal de la pròtesi. "Aconsellem naturalitat, que no sigui massa gran", afirma el doctor De la Peña.

Per procedir a l'implant, el cirurgià fa una incisió d'uns 6 centímetres al solc que hi ha entre els dos glutis, aixeca la capa de teixit i quan arriba al múscul obre la part superficial i col·loca les pròtesis. Al cap de dos mesos, "la pacient pot fer vida normal". Això sí, mai més podrà muntar a cavall o anar amb bicicleta. "Es desaconsella del tot", insisteix el doctor José Abel de la Peña. ▪





Els glutis de Jennifer Lopez són un model per a moltes dones. A la dreta, una pacient preparant-se per sotmetre's a una operació ▪ REUTERS / JORDI SOTERAS

Les xifres

6

centímetres fa la incisió que practica el cirurgià al plec que hi ha entre els dos glutis per introduir les pròtesis de silicona sota els músculs del pacient.

20

anys és la durada mitjana d'una pròtesi de silicona. Amb tot, és recomanable fer proves d'ultrasons cada any per comprovar que no s'hagi produït cap trencament.

Silicona també al tou de la cama

Pròtesis de silicona als pits, als glutis i també... al tou de la cama. La demanda d'implants d'aquesta mena per part de persones que consideren que les seves extremitats són massa fines o massa rectes també augmenta als centres de cirurgia estètica. La tècnica, que va néixer inicialment per solucionar els problemes de malformació que tenien els afectats per la poliomielitis, s'ha acabat aplicant amb finalitats estrictament estètiques. La demanda prové tant d'homes com de dones, segons afirma el director mèdic de la Clínica Planas, Jorge Planas. Precisament, una de les sessions del XVI Curs Internacional que la coneguda clínica barcelonina va organitzar recentment es va dedicar a aquesta tècnica.

Les pròtesis utilitzades tenen forma allargada, amb més volum a la part que es col·loca sota el bessó. La incisió, d'uns 5 centímetres, es fa al plec de darrere del genoll. Col·locar l'implant en aquesta zona és relativament senzill, perquè no hi ha ni artèries ni venes. Després de dos mesos de repòs, es pot fer activitat normal.